

ajo



MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: cuando la planta tenga tres hojas verdaderas.
Dosis: 1,5-2 L/Ha.

2ª aplicación foliar: 30 días después de la 1ª aplicación, como mínimo 3 semanas antes de la recolección.
Dosis: 1,5-2 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Como el ajo tiene un "centro de alta actividad metabólica", es un buen cultivo para usar **BROTOMAX®**, debido a su influencia sobre el metabolismo secundario.
- Hojas más verdes. Más clorofila.
- Mejora el porte de la planta. Mayor vigor.
- No reblandece el diente.
- Aporta calidad: mejor piel y mayor calibre.
- Mayor rendimiento en cosecha.
- Ayuda a la planta a superar el estrés producido al cultivo por las aplicaciones de fungicidas y herbicidas.
- Incrementa el nivel de polifenoles, aumentando el potencial antioxidante.

SEMILLAS

Usar **BROTOMAX®** mezclado con fungicidas.

Dosis: 1,5 litros por cada 1.000 Kgs de diente desgranado.

Conseguimos:

- Mejora la nascencia (menos pérdidas al plantar).
- Favorece el crecimiento de la raíz.

RECOMENDACIONES

Recomendamos el uso de **NUTRACEUTICO®** para reducir notablemente las condiciones que son favorables para el desarrollo de hongos patógenos como *Roya*, *Mildiu*, *Botrytis* y *Stemphylium*. Al entrar en contacto con la superficie foliar, produce una película protectora biodegradable con efecto secante de superficie, que en mezcla con los fungicidas específicos produce una extraordinaria sinergia para el control preventivo de estos hongos.

Evita la formación de rocío y posteriores podredumbres.

Dosis: 0,3%.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®