



algodón

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: desde el estado de 3-4 nudos (3-4 hojas verdaderas) hasta 8-10 nudos.

Dosis: 2 L/Ha.

2ª aplicación foliar: desde las primeras flores hasta plena floración.

Dosis: 3 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

PRODUCCIÓN:

- Mayor rendimiento en cosecha.
- Mayor número de cápsulas por planta.
- Mayor peso de la cápsula.
- Mayor resistencia al calor y al estrés hídrico.
- Mayor retención de las cápsulas, incluyendo las superiores.

CALIDAD:

- Aumenta el índice "micronaire" en la fibra en un 25%

SANIDAD:

- Mejor tasa de éxito en la nascencia e implantación, con lo cual se reducen los costes de replantación y se evitan plantas con diferentes desarrollos y estados fenológicos en el campo.
- Ayuda a superar los desórdenes vasculares (*Verticillium dahliae*, *Fusarium*...) creando nuevos vasos operativos en el xilema.

RECOMENDACIONES

En caso de un fuerte ataque de *Verticillium* realizar una 3ª aplicación al final del cultivo con el objetivo de recuperar la planta.

Dosis: 3 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTO MAX®