

almendra



MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: con un 80% de flor abierta.

Dosis: 0,25%.

2ª aplicación foliar: con un 90% de pétalos caídos.

Dosis: 0,25%.

3ª aplicación foliar: 20-25 días después de la 2ª aplicación.

Dosis: 5 L/Ha.

Puede ser también aplicado **vía suelo** en los mismos momentos.

Dosis: 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Estimula la producción de polifenoles, haciendo al árbol más resistente al ataque de *Phytophthora* y otros desórdenes vasculares de la madera.

Hay una recuperación de vegetación sana, volviéndose el árbol más joven ya que brotan más yemas en la base de las ramas principales.

- Evita la caída de flores y consigue un mejor cuajado.
- Homogeneidad en los calibres.
- Aumenta el rendimiento de la cosecha y el contenido en ácidos grasos, antioxidantes y aromas esenciales del fruto.

RECOMENDACIONES:

Realizar la 1ª aplicación junto con **BIOHIDRAMAR® CREMA** para favorecer y dar homogeneidad a floración y cuajado.

Dosis: 0,2% (2 cc/L).

Realizar la 2ª aplicación junto con **AM-EN®** para inducir la división celular, dando como resultado un mayor número de frutos homogéneos que mantienen la calidad pese a incrementarse la producción.

Dosis: 0,3% (3 cc/L).

Dependiendo del cuajado, realizar la 3ª aplicación, unos 20 días después de la segunda, conjuntamente con **AM-EN®** para mejorarlo.

Dosis: 0,3% (3 cc/L).

Para mejorar la eficacia de los tratamientos, se recomienda la mezcla de los mismos con **QUASSAR®** por su alto poder tensioactivo y de adherencia.

Dosis: 0,1% (1 cc/L).

TRATAMIENTO EN POST-RECOLECCIÓN

Recomendamos una aplicación foliar tras la recolección. Con esta aplicación, particularmente importante para superar enfermedades vasculares, conseguimos una rápida cicatrización de las microheridas producidas durante la cosecha. También se regula la floración en el ciclo vegetativo siguiente, obteniéndose una mayor formación de ramilletes de mayo y ramos mixtos.

Dosis: 0,25%.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTO MAX®