



brócoli y coliflor

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: en el primer riego localizado.
Dosis: 5 L/Ha.

2ª aplicación foliar: a los 30 días después de la plantación (cuando comienzan las máximas necesidades de Nitrógeno en la planta, al empezar la formación de la pella). Dosis: 3 L/Ha. (0,5%). Se puede mezclar con otros productos aplicados en este momento.

OBSERVACIONES:

Recomendamos el uso de **CORRIZ-AM**® mediante fertirrigación en la primera aplicación.

Dosis: 5-7 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mayor desarrollo de la raíz y sus ramificaciones.
- Más vigor.
- Incremento de peso.
- Con la aplicación foliar se consigue incrementar el tamaño de las hojas de cubrimiento, cerrando mejor.
- Mayor resistencia a las podredumbres y enfermedades de cuello (*Sclerotinia*, *Pythium*...)
- Mejor conservación en el almacenamiento, obteniendo plantas más resistentes a las pudriciones blandas bacterianas y a los ablandamientos acuosos causados por hongos.
- En casos de encharcamientos prolongados provocados por lluvias torrenciales, la aplicación de **BROTOMAX**® al 0,5%, al ser compatible con los cobres y fungicidas específicos, ayuda de forma espectacular a la recuperación de las plantas supervivientes.

BROTOMAX®

RECOMENDACIONES:

En brócoli, la formación de rocío en la pella produce microheridas (por efecto lupa con el sol), que son la vía de entrada de hongos. La aplicación de **NUTRACÉUTICO**® evita la formación de rocío en la pella, facilitando su secado y evitando posteriores podredumbres. Este efecto persiste unos 7-10 días.

BROTOMAX®