

caqui



MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: desde primeras hojas separadas hasta botón floral.

Dosis: 3 L/Ha.

2ª aplicación foliar: en crecimiento del fruto (Junio).

Dosis: 3 L/Ha.

Puede ser también aplicado **vía suelo** en los mismos momentos.

Dosis: 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

PRIMERA APLICACIÓN:

- Estimula la brotación, importante en árboles tratados con ácido giberélico el año anterior.
- Prepara el árbol para una buena floración y cuajado.
- Uniformidad en la brotación y floración.
- Revestimiento de la parte inferior del árbol.
- Proporciona excelente equilibrio entre vegetación (superficie foliar) y número de flores.

SEGUNDA APLICACIÓN:

- Revestimiento del árbol.
- Ayuda a superar el efecto de la "salinidad".
- Evita la caída fisiológica de los frutos ya cuajados.
- Incrementa el tamaño de fruto hacia calibres más comerciales.

RECOMENDACIONES:

Realizar la 2ª aplicación conjuntamente con **LANZADERA® CALCIO**, lo que aporta más alto contenido en calcio asimilable, mejorando la dureza y conservación de los frutos. Además, evita fisiopatías.

Es imprescindible realizar una 2ª aplicación de **LANZADERA® CALCIO** a los 15-20 días.

Dosis: 0,3%

Realizar una aplicación con **LANZADERA® MANGANESO** a finales de Mayo para corregir carencias.

Dosis: 0,25%.

PLANTONES:

Recomendamos aplicar **CORRIZ-AM®**, inyectado o mediante riego localizado conjuntamente con **BROTOMAX®**.

1ª aplicación vía suelo: con las primeras hojas.

2ª aplicación vía suelo: a los 30 días.

Dosis: 5L/Ha.

OBSERVACIONES:

En caso de presencia del hongo *Mycosphaerella nawae*, **BROTOMAX®** es compatible con los fungicidas habitualmente utilizados.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®