



cítricos

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación (PRIMAVERA): a partir de inicio de brotación (2cms) hasta antes de floración.

2ª aplicación (VERANO): al comienzo de la brotación de verano.

3ª aplicación (OTOÑO): al comienzo del cambio de color en el fruto (de verde a verde pálido)

DOSIS:

- Vía foliar: 0,3%.
- Vía riego por goteo: 6 L/Ha.
- Usar como mínimo 4 L/Ha con un volumen de caldo de 2.000 L.

Dependiendo del estado de desarrollo de las plantas, puede necesitarse un mayor volumen de caldo para obtener una óptima cobertura de toda la masa foliar.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

APLICACIÓN DE PRIMAVERA:

- Mayor número de flores campaneras.
- Estimular las brotaciones. Buen equilibrio entre vegetación (superficie foliar) y número de flores.
- Preparar el árbol para un buen cuajado.
- Superar ataques de *Phytophthora* spp.

APLICACIÓN DE VERANO:

- Favorecer la brotación para el crecimiento del próximo año.
- Fortalecer la piel para prevenir desórdenes fisiológicos en ella: pata de rata, bufado, pixat...

APLICACIÓN DE OTOÑO:

- Tratamiento clave para superar *Phytophthora* spp.
- Pedúnculos más fuertes. Aumenta la sujeción de los frutos maduros (menos caída).
- Se regula la floración del próximo año, particularmente en variedades del grupo Navel. En la primavera siguiente, obtendremos un importante número de brotes vegetativos (sólo hojas), brotes mixtos y flores campaneras, y por tanto, un buen índice de hojas/número de flores, fundamental para una buena cosecha.
- Evita el secado ("dry end") de los frutos maduros.
- Evita la clareta ("creasing") de los frutos, sobre todo en naranjas Valencia.
- Mejora la piel del fruto.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTO MAX[®]



cítricos

OBSERVACIONES:

En variedades del grupo Navel se consigue un efecto regenerador en la corteza que supera la *Psoriasis*. Buena cicatrización de heridas producidas por poda mecánica. Aconsejamos una aplicación con **BROTOMAX**[®] de 10-15 días después de la poda, mezclado con un fungicida específico.

En caso de gomosis o mal de cuello, realizar una aplicación en la zona afectada.

Dosis: 5 L/Ha

RECOMENDACIONES:

Recomendamos realizar una aplicación conjunta de **AM-EN**[®] y **BIOHIDRAMAR**[®] **CUAJE** para favorecer el cuajado y engordar el fruto, sin perder calidad. Además, se favorece el agarre de los frutos, reduciendo las pérdidas producidas por la caída fisiológica ("porgá"), obteniéndose por tanto mayor producción. También se consigue dar mayor homogeneidad a los calibres, incrementar grados Brix y mejorar la calidad de la piel.

Momento de aplicación: 90% caída de pétalos.

Dosis (foliar):

- **AM-EN**[®] : 0,3%
- **BIOHIDRAMAR**[®] **CUAJE**: 0,1%

Recomendamos realizar la 2ª aplicación conjuntamente con **LANZADERA**[®] **CALCIO**, para evitar fisiopatías. Es recomendable realizar una 2ª aplicación de **LANZADERA**[®] **CALCIO** 15 días después.

Dosis (vía suelo): 10-12 L/Ha.

1ª aplicación vía suelo: al inicio de la brotación de primavera.

Dosis: 5-10 cc/pie.

2ª aplicación vía suelo: 15 días después de la 1ª aplicación.

Dosis: 5-10 cc/pie.

Recomendamos aplicar 5-10 cc/pie de **CORRIZ-AM**[®], inyectado o mediante riego localizado conjuntamente con **BROTOMAX**[®].

BENEFICIOS:

- Adelanta el crecimiento.
- Mejora el enraizamiento.
- Mayor número de hojas. Alarga entrenudos.
- Plantas más protegidas frente a ataques de hongos.
- Mejora afinidad plantón/injerto.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX[®]