



escarola

escarola rizada y lisa

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: a los 10 días después de la plantación. Dosis: 5-7 L/Ha.

2ª aplicación foliar: cuando la planta alcance las 6-8 hojas verdaderas. Dosis: 3 L/Ha. (0,5%). Se puede mezclar con otros productos aplicados en este momento.

3ª aplicación foliar: al 50% de cobertura. Dosis: 3 L/Ha. (0,5%). Se puede mezclar con otros productos aplicados en este momento.

OBSERVACIONES:

Recomendamos el uso de **CORRIZ-AM**® mediante fertirrigación en la primera aplicación.


Dosis: 5-7 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mayor desarrollo de la raíz y sus ramificaciones.
- Más vigor.
- Incremento del peso del cogollo.
- Mayor resistencia a las podredumbres y enfermedades de cuello (Sclerotinia, Pythium...).
- Se observa un alargamiento del ciclo sin producirse el espigado.
- Mejor conservación en el almacenamiento, obteniendo plantas más resistentes a las pudriciones blandas bacterianas y a los ablandamientos acuosos causados por hongos.

PRECAUCIONES:

- **BROTOMAX**® es compatible y sinérgico con todos los insecticidas y fungicidas habitualmente aplicados en escarola, exceptuando el Pirimetanil.
- No aplicar **BROTOMAX**® en los últimos días del ciclo ya que podría favorecer el espigado y la descompactación del cogollo.



BROTOMAX®