



fresa

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

Por su versatilidad, **BROTOMAX®** puede ser aplicado durante gran parte del ciclo del cultivo, siendo especialmente recomendable en los siguientes momentos:

- Primeras hojas verdaderas.
- Entre el engrosamiento de las coronas y la aparición del primer ramillete.
- Entre la maduración del primer ramillete y el cuajado del segundo.
- Entre la maduración del tercer ramillete y el cuajado del cuarto.

Realizar sucesivas aplicaciones tras cada recogida de frutos a las dosis recomendadas, siempre que la rentabilidad del cultivo lo permita.

DOSIS:

Aplicación foliar: 300 ml/100 litros de agua.

Riego localizado: 3 L/Ha.

En caso de estrés en el cultivo debido a agentes meteorológicos (calor, frío, lluvia,...) es aconsejable realizar una aplicación foliar a la dosis de 2-2,5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

PRECOCIDAD: Mayor engrosamiento de coronas y aparición temprana del primer ramillete.

CALIDAD: Buen cuajado de frutos (sin deformaciones), tamaño y color.

PRODUCCIÓN: Equilibrio del desarrollo vegetativo entre las partes aérea y radicular. Evita el decaimiento de la planta tras la recogida de los primeros frutos. Mantiene la planta en óptimas condiciones productivas durante toda la campaña.

SANIDAD: Aumenta el contenido en polifenoles de la planta, incrementando así la capacidad de autodefensa de la misma frente a enfermedades vasculares y su potencial antioxidante.

RECOMENDACIONES:

Realizar una aplicación de **BIOHIDRAMAR® CUAJE** cuando se produce la diferenciación floral, para obtener un buen cuajado de los frutos.

Dosis: 0,1%.

VIVEROS:

1ª aplicación vía riego por goteo: al comienzo del ahijado de la planta (mes de Mayo).

Dosis: 3 L/Ha.

2ª aplicación vía riego por goteo: durante el mes de Agosto.

Dosis: 3 L/Ha.

La 2ª aplicación tiene como objetivo favorecer la resistencia a enfermedades vasculares.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTO MAX®