



hortícolas

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: a los 7-10 días del trasplante.

Dosis: 3 cc/L.

2ª aplicación foliar: 15-20 días después, o antes de la floración.

Dosis: 3 cc/L (invernadero o al aire libre).

3ª aplicación foliar: tras la primera recolección. Puede aplicarse con fungicidas específicos.

Dosis: 3 cc/L.

Aplicaciones foliares subsecuentes: Puede aplicarse cada 12-18 días mientras lo permita la rentabilidad del cultivo.

BROTOMAX® puede ser aplicado en toda clase de cultivos hortícolas (**tomate, pepino, calabacín, pimiento, berenjena,...**) tanto al aire libre como en invernadero. También puede ser aplicado en **riego por goteo**, a la dosis de 3-5 L/Ha.

En semilleros, emplear en pulverización foliar con 2-3 hojas verdaderas.

Dosis: 2 cc/L.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mejora la distribución de las raíces en el bulbo de riego y fuera de él.
- Mayor y más equilibrado desarrollo del cultivo (mejor diferenciación floral, cuajado y mayor producción).
- Como en cualquier cultivo en el que tenemos al mismo tiempo flores y frutos en desarrollo, **BROTOMAX®** regula el ciclo vegetativo, aportando la energía que la planta demanda en las situaciones más críticas.
- Mantiene el nivel de producción en las épocas de menos horas luz.
- La primera aplicación evitará pudriciones del "cuello" y dará más vigor a la planta, consiguiendo un mejor enraizamiento y asentamiento en el terreno definitivo.
- Con las aplicaciones de **BROTOMAX®** superaremos claramente el "colapso" o "muerte súbita" de las plantas, típico declive de muchas hortícolas tras el trasplante o el cuajado.
- Mejora rápidamente la cicatrización de las heridas en la planta tras la recogida del fruto.
- Debido al efecto antioxidante que presenta **BROTOMAX®**, las plantas tratadas permanecen jóvenes durante más tiempo, alargando el ciclo vegetativo y permitiendo más cortes.
- Incrementa el contenido de compuestos fenólicos en las plantas, haciéndolas más resistentes a enfermedades fúngicas y bacterianas.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®

hortícolas



RECOMENDACIONES:

Recomendamos el uso de **NUTRACEUTICO**[®] para reducir notablemente las condiciones que son favorables para el desarrollo de hongos patógenos, ya que al entrar en contacto con la superficie foliar, produce una película protectora biodegradable con efecto secante de superficie.

Dosis: 3 cc/L.

Se recomienda realizar aplicaciones foliares **BIOHIDRAMAR**[®] **CREMA** con el objetivo de conseguir una homogeneización de la floración, cuajado y engorde así como superar momentos de estrés en los siguientes cultivos hortícolas: tomate, pimiento, pepino, berenjena y calabacín.

Dosis: 2 cc/L.

En tomate, pimiento y calabacín se recomienda **LANZADERA**[®] **COBRE** de manera preventiva para fortalecer la planta ante ataques de agentes patógenos.

Dosis: 3 cc/L (vía foliar).

2-3 L/Ha (vía riego).



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX[®]