

# olivo



## MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

**1ª aplicación foliar:** durante todo el proceso de diferenciación de las yemas de brotación vegetativa. Puede hacerse coincidir con el tratamiento contra repilo.

**Dosis:** 0,3%.

**2ª aplicación foliar:** : Desde la floración hasta el final del cuajado de los frutos. Puede hacerse coincidir con el tratamiento de primavera para prays.

**Dosis:** 0,3%.

**3ª aplicación foliar:** aproximadamente un mes antes de la recolección.

**Dosis:** 0,3%.

Puede ser también aplicado **vía suelo** en los mismos momentos.

**Dosis:** 5 L/Ha.

## BENEFICIOS Y VENTAJAS:

### PRIMERA APLICACIÓN:

- Mayor número de yemas latentes brotadas.
- Estimula la vegetación. Mejor revestimiento del árbol.
- Aumenta el contenido en polifenoles, incrementando así la capacidad de autodefensa por lo que ayudamos a superar enfermedades vasculares.

### SEGUNDA APLICACIÓN:

- Incrementa la longitud de los brotes del año. Muy importante para la determinación de la floración del año siguiente, ayudando al crecimiento de las metidas. Supera los desequilibrios que se producen por la competencia de órganos.
- Mayor sujeción de frutos.

### TERCERA APLICACIÓN:

- Acumula reservas para preservar la salida invernal.
- Mayor resistencia al frío (fortalece el entallado sin reblandecerlo).
- Favorece la penetración del potasio.
- Tratamiento clave para ayudar a la planta a superar los ataques de *Verticillium*.

### RECOMENDACIONES:

Recomendamos realizar la tercera aplicación de **BROTOMAX®** añadiendo **LANZADERA® POTASIO** para potenciar la maduración y engorde del fruto.

**Dosis:** 2,5 - 3L/Ha.

Recomendamos en casos de fuerte ataque de *Verticillium*, *Phytophthora*, etc. aplicar **BROTOMAX®** mojando bien el tronco y ramas.

**Dosis:** 5 L/Ha.

### TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN:

- Produce una rápida cicatrización de las micro-heridas producidas por la recolección, frenando la entrada de enfermedades vasculares y de bacterias como la *Tuberculosis*.
- Induce la lignificación de los tejidos vegetales, dificultando la penetración del mosquito de la corteza.
- Consigue una menor caída de hoja.



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**

# olivo



## CALIDAD:

La segunda y tercera aplicación:

- Aumentan la capacidad antioxidante del aceite, estabilizándolo y prolongando su vida.
- Aumentan el rendimiento graso de la aceituna.
- Potencian las propiedades organolépticas varietales.

## PLANTONES:

En nuevas plantaciones recomendamos realizar dos aplicaciones **vía suelo** de **CORRIZAM®**, una el momento del trasplante y otra a los 7-10 días.

### Beneficios:

- Provoca la proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular.
- Genera una mejora vegetativa y un mayor diámetro del tronco.

**Dosis:** 5 cc/pie.

A continuación de estas aplicaciones se realizaran dos aplicaciones **vía suelo** consecutivas de **BROTOMAX®** espaciadas una de otra entre 7 y 10 días.

### Beneficios:

- Estimula la brotación produciendo un mayor nº de brotes y más vigorosos.
- Mayor altura de planta.

**Dosis:** 5 cc/pie.



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**