



# tomate de industria

## MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

**1ª aplicación foliar:** a los 20 días del trasplante.

**Dosis:** 0,3% - 0,5%.

**2ª aplicación foliar:** poco antes de floración.

**Dosis:** 0,3% - 0,5%.

**BROTOMAX®** puede ser aplicado en **riego por goteo**.

**Dosis:** 3 a 5 L/Ha.

En semilleros, emplear en pulverización foliar con 2 hojas verdaderas.

**Dosis:** 3 cc por litro de agua.

## BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- La primera aplicación dará más vigor a la planta, consiguiendo un mejor enraizamiento y asentamiento en el terreno definitivo.
- Mayor y más equilibrado desarrollo del cultivo: más brotes, mejor diferenciación floral, cuajado y mayor producción.
- Aumento de la precocidad.
- Incremento del calibre y uniformidad del fruto.
- Debido al efecto antioxidante que presenta **BROTOMAX®**, las plantas tratadas permanecen jóvenes durante más tiempo, alargando el ciclo vegetativo.
- **BROTOMAX®** aumenta el contenido de compuestos fenólicos en la planta, incrementando así su capacidad de autodefensa frente a enfermedades vasculares (*Phytophthora*, *Phytium*, etc.).

## RECOMENDACIONES:

Recomendamos realizar una aplicación de **CORRIZ-AM®** tras el trasplante para provocar la proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular.

**Dosis (vía suelo):** 3 a 5 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**