



albaricoque

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: se ve la corola.

2ª aplicación: antes del endurecimiento del hueso (30 días antes de recolección).

3ª aplicación: inicio de envero (15 días antes de recolección).

Dosis (vía riego): 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Se consigue un buen cuajado y mejor floración (primera flor).
- Previene y ayuda a superar los ataques de *Phytophthora*.
- Evita la caída fisiológica de frutos ya cuajados. Mayor producción.
- Menor "cracking" en el hueso debido a una mejor lignificación del mismo.
- Con la segunda aplicación conseguimos mayor tamaño de fruto y mayor cantidad de frutos cosechados en primera recolección.
- Mejor resistencia al frío.
- En variedades tempranas se consigue adelantar la recolección, siendo ésta más homogénea.

TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN

Recomendamos realizar una aplicación después de la recolección, y antes de la caída de hojas.

La aplicación post-cosecha aumenta el almacenamiento de nutrientes para el crecimiento del año siguiente.

Dosis (riego): 3-5 L/Ha.

RECOMENDACIONES:

La 2ª y 3ª aplicación son aconsejables para incrementar el calibre y adelantar la cosecha. Es aconsejable realizar las mismas añadiendo **LANZADERA® POTASIO**.

Dosis (foliar): 0,3%.

Recomendamos realizar la 1ª y 2ª aplicación junto con **AM-EN®** para favorecer el cuajado de los frutos sin perder calidad en los mismos pese a incrementarse la producción. Además, se consigue incrementar Grados BRIX, homogeneidad en los calibres, mayor firmeza y precocidad en la coloración de los frutos.

Dosis (foliar): 0,3%.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®