melocotón y nectarina

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: 90% de caída de pétalos (coincide con el 5% caída de collarín).
2ª aplicación: antes de endurecimiento de hueso.
3ª aplicación: inicio de envero (15 días antes de la recolección).

Dosis (vía riego): 5 L/Ha.

APLICACIÓN DE POST-COSECHA:

- Realizar la aplicación en caso de un alto rendimiento en cosecha.
- Es muy aconsejable en casos de fuertes ataques de *Phytophthora*.

Dosis (vía riego): 3-5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

APLICACIÓN DE CAÍDA DE PÉTALOS:

- Asegura una buena y uniforme brotación.
- Actúa sobre *Phytophthora* y enfermedades vasculares (por goteo).
- Se consigue un buen cuajado.
- Provoca la salida de yemas latentes.
- Mejor revestimiento de la parte inferior del árbol.

APLICACIÓN PREVIA A ENDURECIMIENTO DE HUESO (importante):

- Menor "cracking" en el hueso debido a una mejor lignificación del mismo.
- Aumento de la precocidad. Más frutos recolectados en primera cosecha.
- Aumento del calibre. Desplazamiento de la curva de distribución a calibres mayores.
- Protección de la clorofila, debido al efecto antioxidante de **BROTOMAX®**.

APLICACIÓN EN INICIO DE ENVERO:

- Mayor consistencia y color del fruto.
- Actúa sobre *Phytophthora spp*.
- Engorda el fruto.
- Mejor conservación del fruto.
- Aumento del grado Brix.

AGROMÉTODOS, S.A.

BROTOMAX®

melocotón y nectarina

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

APLICACIÓN POST-COSECHA:

- Almacenamiento de nutrientes para la brotación del siguiente año.
- Regula la floración del año próximo, consiguiendo una mayor proporción de ramos mixtos.
- Este tratamiento es especialmente efectivo para reducir la incidencia de enfermedades vasculares.

OBSERVACIONES:

- Dada la sensibilidad de estos frutales a los tratamientos por pulverización, es aconsejable realizar previamente un ensayo varietal para confirmar que no hay problemas de mezclas de **BROTOMAX®** con otros productos.

RECOMENDACIONES:

Recomendamos realizar una aplicación de **BIOHIDRAMAR® CREMA** para estimular el árbol y dar homogeneidad a la floración.
Momento aplicación: desde botón verde.

Dosis foliar: 1,5 a 3 L/Ha.

Recomendamos la aplicación vía foliar de **LANZADERA® 3** para prevenir o corregir eficazmente los estados carenciales de Zinc, Manganeso y Magnesio.

Dosis: 0,2 - 0,3% (2-3 L / 1000 L)

Recomendamos realizar la 1ª aplicación junto con **AM-EN®** para inducir la división celular y el alargamiento de células meristemáticas dando como como resultado frutos con más calibre y más homogéneos.

Realizar un nuevo tratamiento de **AM-EN®** en la 2ª aplicación con el objetivo de favorecer el cuajado, mejorar el color y la calidad del fruto. Además, se produce un aumento de Grados BRIX.

Dosis foliar: 0,3%

Realizar la 2ª aplicación junto con **LANZADERA® CALCIO** para reducir considerablemente la apertura de hueso. Además también disminuye el cracking en nectarinas y aportamos más dureza al fruto. Es necesario realizar una 2ª aplicación de **LANZADERA® CALCIO** 15 días después.

Dosis foliar: 0,3%.

Recomendamos realizar la 3ª aplicación junto con **LANZADERA® POTASIO** para adelantar la cosecha y aumentar el tamaño del fruto.

Dosis (vía suelo): 10 L/Ha.

Para el tratamiento de madera (invierno), se recomienda realizar una aplicación de **QUASSAR®** con el fungicida y/o insecticida autorizados.

Dosis (vía foliar): 0,3 %.

AGROMÉTODOS, S.A.

BROTOMAX®